

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

DLP - 1-7-75 060029

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

(AUDE - GARD - HERAULT - LOZERE - PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE - BAT. 5 - PLACE CHAPTAL

34076 MONTPELLIER CEDEX - TEL. 92.28.72

ABONNEMENT ANNUEL: 50 F

Régisseur de recettes de la D.D.A.

C.C.P. Montpellier 5238-57

nouvelle série
2ème année numéro 19

VIGNE

MILDIOU

Des taches provenant de repiquages ont été observées, comme prévu, le 18 juin puis le 23 (contaminations du 10/11 juin et du 15 juin). Les traitements effectués ont assuré une protection efficace.

Cependant, des taches sont apparues relativement nombreuses, dans des zones où le mildiou ayant été décelé en mai avait été mal maîtrisé. Il s'agit de situations exceptionnelles ; c'est le cas du foyer d'AGDE BESSAN (34).

Ailleurs les taches sont en faible nombre, dispersées sur les vignobles voisins des foyers cas de VILLESEQUE LES CORBIERES (11). Des taches en faible nombre existent à TAVEL (30) ST COME (30) SERNHAC (30) REDESSAN (30) MONTCALM (AIGUES MORTES) 30, ST CHINIAN (34) région de MONTPELLIER (34) CLERMONT L'HERAULT (34) et CARCASSONNE (11) RIVESALTES (66) MARSEILLETTE (11).

Le traitement conseillé dans notre dernier bulletin doit être renouvelé dès réception, s'il a été lavé par les pluies des 21 et 22 juin.

TORDEUSES DE LA GRAPPE

Attendre un prochain bulletin.

POIRIER ET POMMIER

TAVELURE

Au cours du mois de juin des pluies d'orage d'importance diverse ont affecté l'ensemble de la circonscription. Dans quelques situations (Montagne Noire, Cevennes) ces précipitations ont favorisé la tavelure et provoqué quelques nouvelles contaminations qu'il convient de juguler par un traitement immédiat.

Redisons que tout traitement lavé doit être refait sans attendre un avis de la station (cette prescription concerne d'ailleurs toutes les cultures).

CARPOCAPSE

Nos postes de piégeage enregistrent irrégulièrement des captures peu nombreuses - attendre un nouvel avis.

PECHER

TORDEUSE ORIENTALE

Les captures s'intensifient dans tous nos postes de piégeage. La protection recommandée par notre bulletin du 12 juin doit absolument être réalisée pour assurer la récolte de beaucoup d'arbres très peu chargés.

7.1.48

Nous rappelons les fongicides qui sont efficaces contre l'alternariose et le mildiou à la fois : Captafol 80 g/hl - Mancozèbe 160 g/hl - Manèbe 160 g/hl - Propinèbe 210 g/hl (dosés en matière active).

ZEIZERE

La lutte est possible sur les jeunes individus installés dans les organes verts. Il importe donc de surveiller très attentivement les cultures afin d'intervenir de façon efficace. Après l'observation des premiers dégâts utiliser :

Produit	Dose (g/l)	Efficacité (%)	Temps d'attente (jours)	Observations
Le Mévinphos	(50)	efficace même	28	jours après la détection des dégâts
L'Azinphos	(40)	éthyle "	14	"
Le Diethion	(100)	"	14	"
Le Fenthion	(75)	"	14	"
Le Méthidathion	(30)	"	14	"
Le Diazinon	(60)	"	14	"
La Phosalone	(60)	"	14	"
Le Parathion éthyle	(35)	"	7	"
Le Parathion méthyle	(40)	"	7	"
Le Diazinon	(40)	"	7	"
Le Trichlorfon	(120)	"	7	"

(Le chiffre entre parenthèses indique la quantité en grammes de matière active à utiliser par hectolitre de bouillie).

A NOS LECTEURS

Les courts communiqués qui "passent" sur notre demande à la radio, à la télévision, sur les répondeurs téléphoniques n'ont qu'une valeur d'alerte en raison de leur breveté, il convient de se reporter au bulletin publié le même jour.

Les Ingénieurs,

P. BERVILLE

CHRESTIAN, TISSOT, TROUILLON

Tirage du 25 juin 1975

1 440 exemplaires